



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TEMANGGUNG



Apa Yang Harus Dilakukan



**KALAU IMUNISASI ANAK
BELUM LENGKAP?**



**AYAH & BUNDA, PERLU HATI-HATI YA KALAU ANAK BELUM
IMUNISASI SECARA LENGKAP. TAPI TIDAK USAH KHAWATIR,
IMUNISASI ANAK YANG BELUM LENGKAP MASIH BISA
DIKEJAR LOH.**

**YUK SEGERA DATANG KE TEMPAT-
TEMPAT BERIKUT!**



Posyandu



**Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya**



Puskesmas

**SEGERA CARI TAU DAN KONSULTASI SEPUTAR
JADWAL IMUNISASI LENGKAP UNTUK ANAK DEMI
MASA DEPAN YANG CERAH DAN SEHAT**



JENIS DAN JADWAL IMUNISASI KEJAR

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
BCG	1 dosis	Paling lambat usia 11 bulan (< 1 tahun)	-	-
OPV	4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.
IPV	2 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	Interval minimal antar dosis adalah 4 bulan	-

Nb : Anak yang tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang seharusnya perlu dilengkapi status imunisasinya melalui kegiatan imunisasi kejar. Sasaran imunisasi kejar adalah bayi, balita dan anak usia sekolah dasar yang belum melengkapi imunisasi rutin dengan ketentuan sesuai tabel berikut.



JENIS DAN JADWAL IMUNISASI KEJAR

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
DPT - HB - Hib	Usia Bayi : 3 dosis Usia Balita : 4 dosis	Interval minimal antar dosis adalah 4 minggu.	Interval minimal: · Dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan · Dosis kedua dan ketiga adalah 6 bulan · Dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan.	-
Campak Rubella	· Usia bayi: 1 dosis · Usia balita: 2 dosis · Anak usia sekolah: 2 dosis (jika belum pernah)	Segera saat datang ketempat pelayanan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.	Interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 6 bulan.
PCV	3 dosis	· 2 dosis pada usia bayi ditambah 1 dosis pada usia > 12 bulan. · Interval minimal: · Dosis pertama dan kedua adalah 4 minggu. · Dosis kedua dan ketiga adalah 8 minggu.	· Usia 12 – 24 bulan: 2 dosis · Usia > 24 bulan – 59 bulan: 1 dosis · Interval minimal antar dosis adalah 8 minggu.	-



JENIS DAN JADWAL IMUNISASI KEJAR

Jenis Imunisasi	Jumlah Dosis Lengkap	Usia Sasaran Imunisasi Kejar		
		Bayi (0 – 11 bulan)	Balita (12 – 59 bulan)	Anak Sekolah
Rotavirus	3 dosis	Interval minimal antar dosis 4 minggu sampai sebelum usia 7 bulan.	-	-
JE	1 dosis	Hanya di daerah endemis.	Hanya di daerah endemis.	-
Td	2 dosis	-	-	Interval minimal 1 tahun sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat
HPV	2 dosis	-	-	Interval minimal 6 bulan sampai dengan usia sekolah kelas 6 SD/ sederajat